

Informacja o postępowaniu anestezjologicznym – znieczuleniu

Bez znieczulenia większość zabiegów operacyjnych u bolesnych procedur diagnostycznych jest niemożliwa do przeprowadzenia. Rolą lekarza anestezjologa jest zaproponowanie i znieczulenie pacjenta w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej, stan zdrowia pacjenta oraz specyfikę przy spełnieniu współczesnych standardów dotyczących personelu i sprzętu, są bezpieczne dla pacjenta. Jednak każda, nawet najprostsza czynność medyczna jest związana z możliwością wystąpienia powikłań. Szczegółowe i prawdziwe przedstawienie swojego stanu zdrowia i zażywanych leków oraz bezwzględne zastosowanie się do zakazu spożywania pokarmów i napojów przed znieczuleniem pomoże anestezjologowi zminimalizować to ryzyko. Proszę zapoznać się z poniżej przedstawionymi informacjami i wypełnić ankietę anestezjologiczną, która zawiera pytania dotyczące stanu państwa zdrowia. W okresie poprzedzającym zabieg operacyjny spotkacie się Państwo z lekarzem anestezjologiem, który po rozmowie, badaniu oraz zapoznaniu się z dostarczoną przez Państwa dokumentacją podejmie decyzję i zaproponuje Państwu rodzaj znieczulenia oraz wyjaśni ewentualne wątpliwości.

Znieczulenie ogólne (zwane „narkozą”) polega na czasowym „uśpieniu” pacjenta na okres zabiegu operacyjnego. Środek nasenny podaje się zazwyczaj dożylnie. Po zaśnięciu pacjenta anestezjolog kontynuuje podawanie leków nasennych i przeciwbólowych, czuwa nad oddechem i pracą serca. Przez cały czas trwania operacji jest obecny w pobliżu pacjenta, nadzoruje jego stan i na bieżąco rozwiązuje zaistniałe problemy. Przy każdym rodzaju znieczulenia stosuje się podstawowe monitorowanie przyrządowe układu oddechowego i krążenia. Do niektórych rodzajów zabiegów konieczne jest założenie dodatkowych elementów inwazyjnego monitorowania. Zazwyczaj odbywa się to już po zaśnięciu chorego. Z wykonaniem znieczulenia ogólnego mogą wiązać się powikłania. Ogromna większość potencjalnych powikłań ma charakter lekkich i przemijających dolegliwości, nie pozostawiających żadnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Przy znieczuleniach wykonywanych zgodnie z obowiązującymi zasadami ciężkie powikłania są bardzo rzadkie. Ryzyko tego rodzaju powikłań jest wyższe w przypadku pacjentów obciążonych schorzeniami ogólnymi, natomiast w przypadku pacjentów z grupy niskiego ryzyka jest minimalne, nie można go jednak całkowicie wykluczyć. Może wystąpić ból gardła, uczucie drapania, trudności w przełykaniu, nudności i wymioty, trudności z założeniem rurki do oddychania do dróg oddechowych i związane z tym uszkodzenia tkanek, jamy ustnej i zębów, a czasem niedotlenienie narządów wewnętrznych, reakcje uczuleniowe na leki anestezjologiczne, przedostanie się zwymiotowanej treści pokarmowej do płuc i w następstwie zapalenia płuc (stąd tak ważne jest wstrzymanie się od jedzenia i picia przed znieczuleniem), gorączka złośliwa (nieprawidłowa reakcja na niektóre leki znieczulające, choroba dziedziczna).

Znieczulenie regionalne (przewodowe) polega na podaniu leku znieczulającego w okolicy nerwów, splotów nerwowych, także tych wychodzących z kręgosłupa, przewodzących ból z operowanej okolicy. Oprócz tego chory otrzymuje dożylnie leki uspokajające lub nasenne. Po znieczuleniu przewodowym także mogą się zdarzyć powikłania z reguły niegroźne dla życia i zdrowia (bóle głowy, nudności i wymioty, trudności z oddawaniem moczu, pobolewania bóle okolicy lędźwiowej, przejściowe podrażnienie nerwów objawiające się zaburzeniami czucia, mrowieniem lub osłabieniem kończyn, zakażenie).

Lekarz wykonujący znieczulenie szczegółowo państwa poinformuje o technice znieczulenia i możliwych powikłaniach.

ANKIETA

Choroby tarczycy (np. wole obojętne, nadczynność, niedoczynność)

Choroby układu nerwowego (np. padaczka, porażenia, niedowłady, utrata przytomności, miastenia)

Choroby układu kostno-stawowego (np. bóle korzonkowe, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, stawów, krwawienia z nosa, przedłużone krwawienie po usunięciu zęba)

Choroby krwi i układu krzepnięcia (np. anemia, skłonność do wylewów krwawych po uderzeniach)

Choroby oczu (np. jaskra)

Zmiany nastroju (np. depresja, nerwica)

Uczulenia – alergię (np. katar sienny, wysypka, uczulenia na pokarmy, leki, plaster, jodynę)

Jeśli tak, to na jakie substancje?

Jakie są objawy uczulenia?

Inne schorzenia, nie wymienione powyżej?

Jeśli tak, to jakie?

Czy był(a) Pan(i) już kiedyś operowany(a)?

Jeśli tak, to kiedy i z jakiego powodu?

Czy dobrze zniósł Pan/zniosła Pani znieczulenie?

Czy u krewnych Pana(i) wystąpiły kiedyś powikłania związane ze znieczuleniem?

Czy miał(a) Pan(i) transfuzję krwi?

Kiedy?

Czy dobrze zniósł Pan/zniosła Pani transfuzję krwi?

Kiedy miała Pani ostatnią miesiączkę?

Czy jest Pani w ciąży?

Czy stosuje Pani doustne środki antykoncepcyjne?

Czy Pan(i) pali tytoń?

Ile dziennie _____, od kiedy _____

Czy pije Pan(i) alkohol?

Czy zażywa Pan(i) środki uspokajające, nasenne, narkotyki

Jakie?

