

## PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ

Szanowni Państwo, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przeczytanie z uwagą poniższych informacji

1. W dniu badania ostatni posiłek lekkostrawny należy spożyć do 8h przed badaniem, spożycie wody niegazowanej możliwe jest do 4h przed badaniem. W przypadku wykonania badania w godzinach porannych pacjent zobowiązany jest pozostać na czczo.
2. Osoby z chorobami przewlekłymi (np.: nadciśnienie tętnicze i inne) mogą spożyć leki popijając niewielką ilością wody – około 5 godzin przed badaniem. Pacjenci z cukrzycą nie powinni przyjmować doustnych leków przeciwcukrzycowych lub stosować insuliny, gdy nie przyjmują posiłków. Zobowiązani są do kontrolnego pomiaru glikemii w trakcie oczekiwania na badanie endoskopowe.
3. Osoby stosujące leki wpływające na krzepliwość krwi (acenokumarol – sintrom, warfin – warfaryna, kłopidogrel – areplex, plavix, rywaroksaban – xarelton, dabigatran – pradaxa, tikagrelor – brilique, prasugrel – efielent, kwas acetylosalicylowy – acard, polocard) zobowiązane są o poinformowanie o tym fakcie lekarza kierującego oraz wykonującego badanie endoskopowe. Odstawienie leków pozostaje w gestii lekarza rodzinnego.

Lekarz kierujący, w zależności od celu badania (diagnostyczne lub zabieg endoskopowy), poinformuje o sposobie odstawienia leków wpływających na krzepliwość krwi.

4. Uprzejmie prosimy o okazanie posiadanej dokumentacji medycznej zwłaszcza dotyczącej wcześniej wykonywanych badań endoskopowych, zabiegów operacyjnych przewodu pokarmowego lekarzowi wykonującemu badanie endoskopowe.
5. Kobiety w ciąży i matki karmiące zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie lekarza wykonującego badanie endoskopowe.
6. W przypadku wykonywania badania w znieczuleniu dożylnym, pacjenci zobowiązani są do opuszczenia przychodni w towarzystwie osoby bliskiej, nie mogą prowadzić pojazdów a także podejmować decyzji prawnych w okresie 12h od wykonania badania ze znieczuleniem dożylnym.
7. Godzina wykonania badania endoskopowego może być orientacyjna, gdyż czas trwania zabiegów medycznych może być trudny do przewidzenia.
8. Przed badaniem endoskopowym należy podpisać zgodę na wykonanie badania endoskopowego oraz znieczulenia dożylnego (o ile jest ono planowane). Wobec powyższego należy posiadać okulary korekcyjne do czytania, jeśli są stosowane.