



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.I.6330.85.2021

Kielce, dnia

**Państwo
Starostowie
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie
/wszyscy/**

Szanowni Państwo,

w związku z przekazaną Wojewodzie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informacją o pogarszającej się sytuacji epizootycznej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, oraz o ponownym zagrożeniu jej wystąpienia na terenie województwa świętokrzyskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych Państwa urzędów podstawowych informacji dotyczących wirusa (HPAI) opracowanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny.

Proszę również o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty informacji ogólnej o grypie ptaków oraz ulotki, zawierającej praktyczne informacje o zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem grypy ptaków.

Przedmiotowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakładce aktualności:

<https://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/aktualnosci-i-komunikat/aktualnosci>.

Założeniem przedmiotowej akcji jest dotarcie do możliwie największego grona mieszkańców naszego województwa oraz zaangażowanie jak największej liczby instytucji oraz osób na rzecz współpracy w zakresie zapobiegania oraz przygotowania na ewentualne zagrożenie ptasią grypą.

W bieżącym roku na terenie województwa świętokrzyskiego wystąpiły dwa ogniska choroby u drobiu oraz jeden przypadek choroby u dzikiego ptactwa. Ogniska wystąpiły w powiecie ostrowieckim (w gospodarstwie utrzymującym kury i kaczki) i buskim (w gospodarstwie hodującym kury), natomiast w powiecie jędrzejowskim stwierdzono chorobę u bociana.

Z poważaniem

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Sabat
Dyrektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Załączniki:

1. Komunikat ŚWLW ws. grypy ptaków.
2. Informacje ogólne dotyczące grypy ptaków.
3. Zasady bioasekuracji.

Do wiadomości:

1. Komendant Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
2. Świętokrzyski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.
4. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
5. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce.
6. Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
7. Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

**Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)**

Wysoco zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, której przebieg może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci ze śmiertelnością do 100%.

W związku z wystąpieniem ogniska tej choroby na terenie województwa świętokrzyskiego niezwykle ważne jest, aby wszystkie informacje o niepokojących objawach chorobowych lub zwiększonej śmiertelności drobiu (szczególnie indyki, kaczki, kury) oraz dzikich ptaków (przede wszystkim kaczki, gęsi, łabędzie) niezwłocznie przekazywać do odpowiednio terytorialnych Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Celem powiadamiania jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie i zwalczanie choroby.

**DANE KONTAKTOWE POWIATOWYCH INSPEKCJI
WETERYNARYJNYCH**

POWIAT	ADRES	TELEFON
BUSKO ZDRÓJ	ul. Objazdowa 11, 28-100 Busko-Zdrój	tel. (41) 378 44 97
JĘDRZEJÓW	ul. Głowackiego 16, 28-300 Jędrzejów	tel. (41) 386 11 81
KAZIMIERZA WIELKA	ul. Budzyńska 2, 28-500 Kazimierza Wielka	tel. (41) 352 20 51
KIELCE	ul. Ściegiennego 203, 25-116 Kielce	tel. (41) 361 88 17
KOŃSKIE	ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie	tel. (41) 372 31 85
OPATÓW	ul. Partyzantów 46, 27-500 Opatów	tel. (15) 868 40 93
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	ul. Os. Słoneczne 5a, 27-400 Ostrowiec Św.	tel. (41) 247 51 57
PIŃCZÓW	ul. Łakowa 28, 28-400 Pińczów	tel. (41) 357 74 63
SANDOMIERZ	ul. Frankowskiego 10, 27-600 Sandomierz	tel. (15) 832 70 53
SKARŻYSKO - KAMIENNA	ul. Warszawska 95, 26-110 Skarżysko-Kam.	tel. (41) 252 19 64
STARACHOWICE	ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice	tel. (41) 274 71 13
STASZÓW	ul. Wojska Polskiego 1, 28-200 Staszów	tel. (15) 864 25 36
WŁOSZCZOWA	ul. Żwirki 2, 29-100 Włoszczowa	tel. (41) 394 49 92

Grypa ptaków – informacje ogólne

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale niestety również (w zależności od umów bilateralnych) z obszaru całego państwa. Generuje to bardzo wymierne straty finansowe. Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczone do Azji i Afryki. Potencjał zoonotyczny (tzn. stopień zagrożenia dla zdrowia człowieka) wirusów grypy ptaków występujących w ostatnich latach w Europie jest niski, ale obserwowane są pewne oznaki wskazujące na stopniowy wzrost poziomu adaptacji dla ssaków, o czym świadczą przypadki u lisów i fok w kilku państwach Starego Kontynentu. W sezonie 2020/2021 zgłoszono też kilka przypadków zakażeń wirusem H5N8 u pracowników ferm w Rosji, w większości bezobjawowych. W przypadkach podejrzeń i potwierdzonych ognisk grypy ptaków, osoby z grup ryzyka, tzn. hodowcy, lekarze weterynarii, osoby biorące udział w zwalczaniu choroby oraz pracownicy zakładów utylizacyjnych, muszą stosować środki ochrony indywidualnej, tj. odzież ochronną, maski, gogle oraz rękawice.

Wyróżnia się wiele odmian wirusa grypy, które oznaczane są symbolami, takimi jak np. H5N1, H5N5, H5N6 czy H5N8. Choroba występuje też w dwóch postaciach klinicznych: jako grypa ptaków o niskiej zjadliwości (LPAI) oraz znacznie groźniejsza wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI).

Wirusy grypy charakteryzują się dużym stopniem zmienności genetycznej, a to sprawia, że skuteczność szczepionek jest bardzo ograniczona; nie opracowano również skutecznych leków.

Dlatego, jak na razie jedyną efektywną bronią w walce z grypą ptaków jest:

- szybkie rozpoznanie choroby w laboratorium;
- skuteczna likwidacja ptaków w ognisku oraz
- wprowadzenie tymczasowych restrykcji na obszarze występowania grypy, aby zapobiec jej dalszemu rozprzestrzenieniu (zgodnie z decyzją powiatowego lekarza weterynarii).

Poza szybkim tempem zmienności genetycznej, wirus posiada szereg innych niekorzystnych cech. Na przykład długo przeżywa w niskich temperaturach: w temperaturze +4°C (temperatura lodówki) ponad 2 miesiące, a w zamrożeniu wiele miesięcy, a nawet lat. Dlatego też mylny, choć bardzo rozpowszechniony, jest pogląd, że „zima wymrozi” wirusy grypy, gdyż to właśnie w tym

okresie choroba występuje najczęściej. Wirus jest zdradliwy również z tego względu, że u jednych ptaków (np. kur czy indyków) może powodować bardzo gwałtowny przebieg i wysoką śmiertelność, podczas gdy przedstawiciele innych gatunków (np. kaczek czy gęsi) czasami chorują, a niekiedy pozostają zdrowe lub wykazują objawy mało specyficzne. W tym samym czasie wirus może się u nich niepostrzeżenie namnażać i mogą one stanowić „ciche” źródło zakażenia dla wrażliwych ptaków.

Na szczęście wirus grypy posiada też kilka słabych punktów. Po pierwsze – jest bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę i pod działaniem 70°C ginie prawie natychmiast. Dlatego też drób i jaja właściwie upieczone, usmażone lub ugotowane są w pełni bezpieczne. Po drugie – powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, mydło i detergenty bardzo skutecznie eliminują zagrożenie. Zachowanie podstawowych zasad higieny, częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, są prostymi, a jednocześnie bardzo efektywnymi sposobami zapobiegania grypie.


W jaki sposób dochodzi do rozprzestrzeniania wirusów grypy ptaków i jak wirus przedostaje się do gospodarstwa?

Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim związane ze środowiskiem wodnym, tzn. głównie kaczki i gęsi. Inne gatunki mogą w ograniczonym stopniu odgrywać rolę w rozprzestrzenianiu wirusa na bliskie odległości, a niektóre z nich (np. łabędzie), ze względu na dużą wrażliwość na zakażenie, skutkującą wysoką śmiertelnością, są bardzo istotnym „wskaźnikiem” obecności wirusa na danym terenie. Podobną rolę odgrywają ptaki drapieżne, żerujące na zwłokach padłych ptaków wodnych.

Drób może się zakażyć jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Nie jest przy tym konieczne, aby użytkowanie tych miejsc odbywało się w tym samym czasie. Wirus może bowiem przeżyć w wodzie i innym wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni, szczególnie w niskiej temperaturze (o czym wspomniano wyżej). **Tak więc zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno-zimowych długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu.** Należy jednak pamiętać, że do zakażenia może dojść nie tylko wtedy, gdy wypuszczany na zewnątrz drób będzie korzystał z tych samych siedlisk co ptaki wolno żyjące, ponieważ wprowadzenie do gospodarstwa słomy albo zielonki zanieczyszczonych odchodami zawierającymi wirus może być przyczyną zachorowania. Dlatego jest niezwykle istotne, aby w okresie wysokiego ryzyka nie tylko utrzymywać ptaki w zamknięciu, ewentualnie na ogrodzonych i ściśle kontrolowanych wybiegach, ale należy też właściwie zabezpieczać słomę pod szczelnym przykryciem lub dezynfekować z zewnątrz baloty środkami dezynfekcyjnymi, które można stosować w obecności ptaków. Bardzo ważne jest, aby myśliwi po polowaniach nie wchodzili przez 3 doby do pomieszczeń, gdzie utrzymywany jest drób, a najlepiej w okresie wysokiego zagrożenia zrezygnowali z polowań. Nie wolno też wprowadzać do gospodarstwa drobiu niewiadomego pochodzenia, a szczególnie ostrożnie podchodzić do pokątnych ofert sprzedaży ptaków po „okazyjnej” cenie od nieznanych osób. Takie działania są nielegalne. Handel drobiem jest dozwolony tylko w okresie, gdy grypa na danym obszarze nie występuje, dodatkowo w ściśle wyznaczonych miejscach i pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.

Jeśli jednak wirus znajdzie się w gospodarstwie, może ulec dalszemu rozwleczeniu przez człowieka na butach, odzieży czy środkach transportu. Właściciel drobiu powinien zawsze pamiętać o tym, że każda choroba charakteryzuje się tzw. „okresem inkubacji”, kiedy wirus już jest w gospodarstwie, ale ptaki, chociaż same wyglądają zdrowo, wydają już wirus do

otoczenia. Dlatego do obsługi ptaków należy zawsze wykorzystywać oddzielną odzież wierzchnią i buty, w których nie wolno wychodzić poza teren obiektu, w którym znajdują się ptaki. Pewną rolę w pojawianiu się nowych ognisk choroby może odgrywać wiatr, ale raczej na krótkie odległości (150-200 metrów). Sposoby szerzenia się zakażeń wirusem grypy przedstawia schematycznie poniższa rycina:




Jakie objawy mogą sugerować, że drób choruje na grypę?

Na początku choroby spada apetyt i pragnienie. Ptaki są osowiałe, mają nastroszone pióra i gromadzą się wokół źródeł ciepła. Ponieważ wirus atakuje mózg, chore osobniki mogą wykazywać objawy nerwowe: drgawki, porażenia skrzydeł, chwiejny chód, skręt szyi, czy też wygięcie szyi na grzbiet (tzw. „patrzenie w gwiazdy”). Towarzyszyć temu może duszność, sine zabarwienie grzebienia i biegunka. U drobiu nieśnego gwałtownie spada liczba składanych jaj, a jaja już złożone mogą być pozbawione skorup (tzw. „lanie jaj”). Hodowca powinien jednak pamiętać, że opisane wyżej objawy nie zawsze muszą występować. Czasami występują nagle przypadki śmiertelne, bez poprzedzających je zauważalnych zmian w zachowaniu. Dotyczy to przede wszystkim kur i indyków. Z kolei u dorosłych kaczek jedynym zauważalnym objawem mogą być nagłe spadki nieśności i zmniejszone pobieranie paszy i wody.


Jak zminimalizować ryzyko wniknięcia wirusa do gospodarstwa?

Aktualnie jedyną skuteczną metodą zapobiegania jest ściśle przestrzeganie zasad bioasekuracji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow>

Efektem współpracy Krajowej Rady Drobiarskiej Izby Gospodarczej, Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego Puławach było opracowanie ulotki dotyczącej zasad bioasekuracji:




GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOSEKURACJI?



Jak postępować w przypadku podejrzenia grypy ptaków?

W przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących objawów, mogących wskazywać na obecność wirusa w gospodarstwie, należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii, który pobierze próbki do badań laboratoryjnych. Aktualny wykaz telefonów kontaktowych do powiatowych inspektoratów weterynarii znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii <https://pasze.wetgiw.gov.pl/piw/demo/> Chorych ptaków i padłych nie

wolno dotykać ani podejmować prób leczenia. W przypadku zauważenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza z grupy ryzyka (kaczki, łabędzie, gęsi, ptaki drapieżne), należy również powiadomić powiatowego lekarza weterynarii.



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl

GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?

1

Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!

2

Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.

3

Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.

4

Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).

5

Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.

6

Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.

7

8

9

