



APEL

do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.


Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


UWAGA! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



PTASIA GRYPA!

Wysoce zjadliwa grypa ptaków!!!



W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

ZAKAZUJE SIĘ:

- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
- organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych ptaków,
- oferowania, prezentacji w celu sprzedaży oraz sprzedaży żywych ptaków na targowiskach oraz
- jakiegokolwiek innego sposobu zbycia ptaków, utrzymywanych w gospodarstwach.

NAKAZUJE SIĘ:

- UTRZYMYWANIE DROBIU W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH, uniemożliwiając mu kontakt z : innym drobiem lub ptakami dzikimi oraz zbiornikami wodnymi lub poidłami, do których ma dostęp ptactwo dzikie (np. w zamkniętych budynkach, zabezpieczonych przed dostępem innych ptaków niż utrzymywane w gospodarstwie),
- zabezpieczenie i przechowywanie paszy dla drobiu w sposób uniemożliwiający jej kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych nasączonych roztworem środka dezynfekcyjnego przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób,
- STOSOWANIE ODZIEŻY OCHRONNEJ przeznaczonej do użytku tylko w konkretnym budynku gospodarskim, w którym utrzymywany jest drób,
- DOKONYWANIE CODZIENNEGO PRZEGLĄDU STADA DROBIU,
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA: zwiększonej śmiertelności, znacznego spadku pobierania paszy i wody, duszności, biegunki, nagłego spadku nieśności, ślucy, wybroczyn, objawów nerwowych takich jak: skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, nieskoordynowanych ruchów, o ww. fakcie NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARI .

! UWAGA !

UWAGA

ZAGROŻENIE WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW

PTASIA GRYPA - zakaźna, zaraźliwa choroba drobiu wywołana przez wirus

ATAKOWANE GATUNKI - wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych; (największe straty wśród kur i indyków).

ŹRÓDŁA ZAKAŻENIA - ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi nosicielami, zwłaszcza migrujące ptaki wodne.

PODSTAWOWE OBJAWY - osowiałość, gwałtowny spadek lub utrata produkcji jaj, miękkie skrupy jaj, obrzęk i zasinienie grzebienia oraz dzwonków, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podczołowych, objawy nerwowe, biegunka, nagle upadki zwierząt bez widocznych objawów - śmiertelność do 100%.

ROZPRZESTRZENIANIE CHOROBY - zakażone ptaki wydają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych.

Ptaki domowe zarażają się przez kontakt bezpośredni z migrującymi ptakami dzikimi nosicielami choroby lub przez kontakt pośredni: na przykład z zakażoną wodą do picia, paszą.

Rozprzestrzenianie choroby może następować również przez sprzęt, środki transportu, człowieka.

WRAŻLIWOŚĆ WIRUSA - wirusa zabija obróbka termiczna, powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

HODOWCO DROBIU!

Chroń swoje ptaki przed kontaktem z ptactwem dzikim
zwłaszcza wodnym i drapieżnym.