W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i migracjami dzikich ptaków będących naturalnym rezerwuarem i wektorem wirusów grypy ptaków oraz zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku przypomina, iż należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania chorób u drobiu (Dz.U. 2026 poz. 335).

Zgodnie z jego zapisami wszyscy hodowcy drobiu powinni:

- utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

- zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsca, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

- utrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków,

- karmić i poić drób w zamkniętym pomieszczeniu lub w osłoniętym miejscu w sposób, który zabezpiecza paszę i wodę przed dostępem gryzoni, zwierząt domowych i zwierząt dzikich, w szczególności dzikich ptaków, oraz przed ich odchodami,

- zabezpieczyć paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami, zwierzętami domowymi i zwierzętami dzikimi, w szczególności dzikimi ptakami, oraz z ich odchodami

- umieszczać gniazda dla drobiu wewnątrz budynków,

- dokonywanie codziennego przeglądu drobiu oraz prowadzić dokumentację zawierającej informacje o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych,

- powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu, jeśli w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne,

Jednocześnie zakazuje się:

- wprowadzać do gospodarstwa i wyprowadzać z niego kury lub indyki niezaszczepione przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu,

- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

- pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku przypomina, iż najczęstszymi objawami wysoce zjadliwej ptasiej grypy u kur są:

- brak apetytu i pragnienia, gwałtowny spadek spożywanej paszy i wody

- osowiałość, ptaki mają nastroszone pióra i gromadzą się wokół źródeł ciepła

- trudności w oddychaniu

- silne obrzęki zatok podoczodołowych

- sinica nieopierzonych części głowy – grzebienia i dzwonków

- objawy nerwowe: drgawki, porażenia skrzydeł, przewracanie się na grzbiet

- choroba może mieć bardzo gwałtowny przebieg i mogą występować tylko nagłe i masowe przypadki śmiertelne, bez poprzedzających je zauważalnych zmian w zachowaniu.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Lipsku
Monika Mączka